

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
**Наказ Міністерства охорони**  
**здоров'я України**  
21.02.2018 № 169  
**Реєстраційне посвідчення**  
№ 010/5625/01/01

**ІНСТРУКЦІЯ**  
**для медичного застосування лікарського засобу**

**ВОДА ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ**  
**(WATER FOR INJECTIONS)**

**Склад:**

*діюча речовина:* вода для ін'єкцій;

1 контейнер однодозовий містить: води для ін'єкцій 2 мл або 5 мл, або 10 мл, або 20 мл;

1 пляшка містить: води для ін'єкцій 100 мл або 200 мл, або 400 мл;

1 контейнер містить: води для ін'єкцій 100 мл або 200 мл, або 250 мл, або 400 мл, або 500 мл, або 1000 мл, або 2000 мл, або 3000 мл, або 5000 мл.

**Лікарська форма.** Розчинник для парентерального застосування.

**Основні фізико-хімічні властивості:** прозора безбарвна рідина без запаху та смаку.

**Фармакотерапевтична група.** Розчинники та засоби розведення. Код АТХ V07A B.

**Фармакологічні властивості.**

**Фармакодинаміка.**

Вода для ін'єкцій апірогенна, хімічно не активна, не має фармакологічної дії.

**Фармакокінетика.**

Вода для ін'єкцій є лише транспортним засобом для введення інших лікарських засобів, фармакокінетика буде залежати від їх фармакологічних властивостей.

**Клінічні характеристики.**

**Показання.**

Воду для ін'єкцій застосовувати для приготування стерильних розчинів лікарських і діагностичних засобів, призначених для підшкірного, внутрішньом'язового, внутрішньовенного або ректального введення.

**Протипоказання.**

Воду для ін'єкцій як розчинник лікарських або діагностичних засобів не застосовувати, якщо в інструкції для медичного застосування препарату зазначений інший розчинник. Не застосовувати препарат для промивання очей при офтальмологічних операціях.

*Желт*

***Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.***

Препарат сумісний з більшістю лікарських засобів, оскільки не проявляє фармакологічної або хімічної взаємодії, тому його можна застосовувати для розчинення різних лікарських засобів.

***Особливості застосування.***

Воду для ін'єкцій не можна вводити безпосередньо внутрішньосудинно через низький осмотичний тиск у зв'язку з ризиком виникнення гемолізу!

***Застосування у період вагітності або годування груддю.***

Можна застосовувати у період вагітності або годування груддю.

***Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.***

Не впливає.

***Спосіб застосування та дози.***

Приготування розчинів лікарських або діагностичних засобів з використанням води для ін'єкцій здійснюється у стерильних умовах (відкриття ампул, наповнення водою шприца та ємностей з лікарськими засобами). Кількість води для ін'єкцій з метою приготування лікарського засобу визначається інструкцією для медичного застосування останнього. Добова доза і швидкість введення мають відповідати інструкціям з дозування доданих лікарських засобів.

***Діти.***

Можна застосовувати у педіатричній практиці.

***Передозування.***

Не описане.

***Побічні реакції.***

Не описані.

***Термін придатності.***

2 роки.

***Умови зберігання.***

Зберігати у недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С.

***Упаковка.***

По 100 мл або 200 мл, або 400 мл у пляшках. По 100 мл або 200 мл, або 250 мл, або 400 мл, або 500 мл, або 1000 мл, або 2000 мл, або 3000 мл, або 5000 мл у контейнерах. По 2 мл або 5 мл у контейнерах однодозових № 10 у пачці. По 10 мл або 20 мл у контейнерах однодозових № 5 у пачці.

**Категорія відпуску.** Без рецепта.



**Виробник.** ТОВ «Юрія-Фарм».

**Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності.**  
Україна, 03680, м. Київ, вул. М. Амосова, 10. Тел./факс: 275-01-08; 275-92-42.

**Дата останнього перегляду.**

*h*

*Ладаєвська*

Узгоджено з матеріалами  
реєстраційного доось

Узгоджено з матеріалами  
реєстраційного доось

7

*Метод узгодження*  
*18.12.2016*

