

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
21.02.2017 № 169
Реєстраційне посвідчення
№ UA/5625/01/01

ЗМІНИ ВНЕСЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
26.04.2018 № 803

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування лікарського засобу

ВОДА ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ
(WATER FOR INJECTIONS)

Склад:

діюча речовина: вода для ін'єкцій;

1 контейнер однодозовий містить: води для ін'єкцій 2 мл або 5 мл, або 10 мл, або 20 мл;

1 пляшка містить: води для ін'єкцій 100 мл або 200 мл, або 400 мл;

1 контейнер містить: води для ін'єкцій 100 мл або 200 мл, або 250 мл, або 400 мл, або 500 мл, або 1000 мл, або 2000 мл, або 3000 мл, або 5000 мл.

Лікарська форма. Розчинник для парентерального застосування.

Основні фізико-хімічні властивості: прозора безбарвна рідина без запаху та смаку.

Фармакотерапевтична група. Розчинники та засоби розведення. Код АТХ V07A B.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка.

Вода для ін'єкцій апірогенна, хімічно не активна, не має фармакологічної дії.

Фармакокінетика.

Вода для ін'єкцій є лише транспортним засобом для введення інших лікарських засобів, фармакокінетика буде залежати від їх фармакологічних властивостей.

Клінічні характеристики.

Показання.

Воду для ін'єкцій застосовувати для приготування стерильних розчинів лікарських і діагностичних засобів, призначених для підшкірного, внутрішньом'язового, внутрішньовенного або ректального введення.

Протипоказання.

Воду для ін'єкцій як розчинник лікарських або діагностичних засобів не застосовувати, якщо в інструкції для медичного застосування препарату зазначений інший розчинник. Не

застосовувати препарат для промивання очей при офтальмологічних операціях.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Препарат сумісний з більшістю лікарських засобів, оскільки не проявляє фармакологічної або хімічної взаємодії, тому його можна застосовувати для розчинення різних лікарських засобів.

Особливості застосування.

Воду для ін'єкцій не можна вводити безпосередньо внутрішньосудинно через низький осмотичний тиск у зв'язку з ризиком виникнення гемолізу!

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Можна застосовувати у період вагітності або годування груддю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Не впливає.

Спосіб застосування та дози.

Приготування розчинів лікарських або діагностичних засобів з використанням води для ін'єкцій здійснюється у стерильних умовах (відкриття ампул, наповнення водою шприца та ємностей з лікарськими засобами). Кількість води для ін'єкцій з метою приготування лікарського засобу визначається інструкцією для медичного застосування останнього. Добова доза і швидкість введення мають відповідати інструкціям з дозування доданих лікарських засобів.

Діти.

Можна застосовувати у педіатричній практиці.

Передозування.

Не описане.

Побічні реакції.

Не описані.

Термін придатності.

2 роки.

Умови зберігання.

Зберігати у недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С.

Упаковка.

По 100 мл або 200 мл, або 400 мл у пляшках. По 100 мл або 200 мл, або 250 мл, або 400 мл, або 500 мл, або 1000 мл, або 2000 мл, або 3000 мл, або 5000 мл у контейнерах. По 2 мл або 5 мл у контейнерах однодозових № 10 у пачці. По 10 мл або 20 мл у контейнерах однодозових № 5 у пачці.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Виробник. ТОВ «Юрія-Фарм».

Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності.

Україна, 18030, Черкаська область, м. Черкаси, вул. Вербовецького, 108
тел.(044)281-01-01

Дата останнього перегляду.