



3% раствор натрия хлорида для ингаляций

- ✓ Прямой муколитический эффект^{1,2}
- ✓ Действует непосредственно в очаге воспалительного процесса^{4,5};
- ✓ Эффект наступает сразу же во время ингаляции³;
- ✓ Оказывает антибактериальное и иммуномодулирующее действие^{1,2};
- ✓ Безопасен даже для детей, беременных, пожилых людей^{3,4};
- ✓ Удобен в использовании!



ЛЕКАРСТВО ДЕЙСТВУЕТ ТАМ, ГДЕ НУЖНО!




Рис. Эффекты 3% раствора натрия хлорида для ингаляций^{1,2}



+ 0,1% % раствор гиалуроновой кислоты

3% раствор натрия хлорида для ингаляций

Анатомо-физиологической особенностью дыхательной системы ребенка в возрасте от 0 до 6 лет является высокая вязкость мокроты, поэтому слизистая трахеобронхиального дерева у детей этого возраста нуждается в усиленном увлажнении!⁶



ЛОРДЕ® ГИАЛЬ – ПРЯМОЙ МУКОЛИТИК С ЭФФЕКТОМ УСИЛЕННОГО УВЛАЖНЕНИЯ СЛИЗИСТОЙ!

LORDE®¹ и LORDE® hyal²

ПОКАЗАНИЯ^{4,5}:

- Бронхиты, бронхиолиты;
- Хронические обструктивные заболевания легких;
- Бронхоэктатическая болезнь;
- Острые и хронические заболевания носоглотки, носовой полости и пазух;
- Гипертрофия аденоидов у детей;
- Круглогодичный и сезонный аллергический ринит.

ПРИМЕНЯТЬ ЛОРДЕ ОЧЕНЬ ПРОСТО!

Ингаляционно путем вдыхания через рот или нос с помощью небулайзера (ЮЛАЙЗЕР®) и/или интраназального введения по 2-4 мл раствора 2 раза в день.

При необходимости кратность приема может быть увеличена.

Применяется с рождения!

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ по применению медицинского изделия LORDE® и LORDE® hyal.

Описание. LORDE® и LORDE® hyal – раствор стерильный для ингаляционного введения, облегчающий дыхание путем разрежения и улучшения выведения секрета слизистой оболочки верхних и нижних дыхательных путей у пациентов с воспалительными заболеваниями дыхательных органов за счет осмотического эффекта. Состав LORDE®: 1 мл раствора содержит натрия хлорид – 30 мг. Состав LORDE® hyal: 1 мл раствора содержит натрия хлорид – 30 мг; натрия гиалуронат – 1 мг.

Противопоказания. LORDE® и LORDE® hyal противопоказан при повышенной индивидуальной чувствительности к компонентам препарата. Побочные реакции. У лиц с индивидуальной непереносимостью компонентов раствора возможны аллергические реакции. В редких случаях может возникнуть гиперемия слизистой носа, кашель или бронхоспазм. Использование детьми должно осуществляться под наблюдением взрослых! В случае возникновения бронхоспазма или кашля прекратить применение и сообщить врачу. Не использовать изделие, если контейнер был поврежден или не полностью закрыт во время вскрытия. Перед применением LORDE® и LORDE® hyal ознакомьтесь, пожалуйста, с полной инструкцией производителя.

Литература

1. Hypertonic Saline in Treatment of Pulmonary Disease in Cystic Fibrosis Emer P. Reeves, Kevin Molloy et al /The Scientific World Journal Volume, 2012.
2. Nebulised hypertonic saline solution for acute bronchiolitis in infants (Review) Zhang L, Mendoza-Sassi RA et al /The Cochrane Collaboration, 2013
3. Застосування розчину Лорде Гіпер в небулайзерній терапії пацієнтів пульмонологічного профілю С.В. Коваленко / Здоров'я України № 22 (395), 2016.
4. Інструкція із застосування LORDE®.
5. Інструкція із застосування LORDE® hyal.
6. Нарушение и коррекция мукоцилиарного клиренса при заболеваниях дыхательных путей и ЛОР-органов. Ходзицкая В.К./Журнал «Болезни и антибиотики» 1 (03), 2010



САМОЛЕЧЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОПАСНО ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

Данный материал предназначен только для медицинских специалистов и для распространения в ходе специализированных медицинских мероприятий. ООО «ЮРИЯ-ФАРМ» не рекомендует применять Лорде® и Лорде® гипер с целями, отличающимися от прописанных в инструкции.



- прямой путь к выведению мокроты!



+ усиленное увлажнение

