




3% розчин натрію хлориду для інгаляцій

- ✓ Прямий муколітичний ефект^{1,2}
- ✓ Діє безпосередньо в осередку запального процесу^{4,5};
- ✓ Ефект настає одразу під час інгаляції³;
- ✓ Виявляє антибактеріальну та імуномодулюючу дії^{1,2};
- ✓ Безпечний навіть для дітей, вагітних, людей похилого віку^{3,4};
- ✓ Зручний у використанні!



ЛІКИ ДІЮТЬ ТАМ, ДЕ ТРЕБА!



+ 0,1% розчин гіалуронової кислоти

3% розчин натрію хлориду для інгаляцій

Анатомо-фізіологічною особливістю дихальної системи дитини віком від 0 до 6 років є висока в'язкість мокротиння, саме тому слизова трахеобронхіального дерева у дітей цього віку потребує посиленого зволоження!⁶



ЛОРДЕ® ГІАЛЬ - ПРЯМИЙ МУКОЛІТИК З ЕФЕКТОМ ПОСИЛЕНОГО ЗВОЛОЖЕННЯ СЛИЗОВИХ!

LORDE®¹ та LORDE® hyal²

ПОКАЗАННЯ^{4,5}:

- Бронхіти, бронхіоліти;
- Хронічні обструктивні захворювання легень;
- Бронхоектатична хвороба;
- Гострі та хронічні захворювання носоглотки, носової порожнини та пазух;
- Гіпертрофія аденоїдів у дітей;
- Цілорічний та сезонний алергічний риніт.

ЗАСТОСОВУВАТИ ЛОРДЕ ДУЖЕ ПРОСТО!

Інгаляційно шляхом вдихання через рот або ніс за допомогою небулайзера (ЮЛАЙЗЕР®) та/або інтраназального введення по 2-4 мл розчину 2 рази на день.

За необхідності кратність прийому може бути збільшено.

Застосовується з народження!

КОРОТКА ІНСТРУКЦІЯ із застосування медичного виробу LORDE® та LORDE® hyal.

Опис. LORDE® та LORDE® hyal - розчин стерильний для інгаляційного введення, який полегшує дихання шляхом розрідження та покращення виведення секрету слизової оболонки верхніх та нижніх дихальних шляхів у пацієнтів із запальними захворюваннями органів дихання за рахунок осмотичного ефекту. Склад LORDE®: 1 мл розчину містить натрію хлорид – 30 мг. Склад LORDE® hyal: 1 мл розчину містить натрію хлорид – 30 мг; натрію гіалуронат – 1 мг.

Протипоказання. LORDE® та LORDE® hyal протипоказаний при підвищеній індивідуальній чутливості до компонентів виробу. Побічні реакції. В осіб з індивідуальною непереносимістю компонентів розчину можливі алергічні реакції. У поодиноких випадках можуть виникати гіперемія слизової носа, кашель або бронхоспазм. Використання дітьми повинно проходити під наглядом дорослих! У разі настання бронхоспазму або кашлю припинити використання та повідомити лікаря. Не використовувати виріб, якщо контейнер був пошкоджений або не повністю закритий під час першого відкриття. Перед застосуванням LORDE® та LORDE® hyal ознайомтесь, будь ласка, з повною інструкцією виробника.

Література

1. Hypertonic Saline in Treatment of Pulmonary Disease in Cystic Fibrosis Emer P. Reeves, Kevin Molloy et al /The Scientific World Journal Volume, 2012.
2. Nebulised hypertonic saline solution for acute bronchiolitis in infants (Review) Zhang L, Mendoza-Sassi RA et al /The Cochrane Collaboration, 2013
3. Застосування розчину Лорде Гіпер в небулайзерній терапії пацієнтів пульмонологічного профілю С.В. Коваленко / Здоров'я України № 22 (395), 2016.
4. Інструкція із застосування LORDE®.
5. Інструкція із застосування LORDE® hyal .
6. Нарушение и коррекция мукоцилиарного клиренса при заболеваниях дыхательных путей и ЛОР-органов. Ходзицкая В.К./Журнал «Болезни и антибиотики» 1 (03), 2010



- прямий шлях до виведення мокротиння!



+ посилене зволоження



САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ'Я

Цей матеріал призначений лише для медичних фахівців і для розповсюдження під час спеціалізованих медичних заходів. ТОВ «ЮРІЯ-ФАРМ» не рекомендує застосовувати Лорде® та Лорде® гіаль із цілями, що відрізняються від тих, які прописані в інструкції.