

ІНСТРУКЦІЯ  
для медичного застосування лікарського засобу

**РОПІЛОНГ  
(ROPILONG)**

**Склад:**

дюча речовина: ропівакайн;  
1 мл розчину містить ропівакайну гідрохлориду моногідрату 7,93 мг, що еквівалентно 7,5 мг ропівакайну гідрохлориду; допоміжні речовини: натрію хлорид, кислота хлористоводнева концентрована, натрію гідроксид, вода для ін'єкцій.

**Лікарська форма.** Розчин для ін'єкцій.

**Основні фізико-хімічні властивості:** прозора безбарвна рідина.

**Фармакотерапевтична група.** Засоби для місцевої анестезії. Аміди.

Код ATX N01B B09.

**Фармакологічні властивості.**

Фармакодинаміка.

Механізм дії. Ропівакайн — чистий енантіомер, який є місцевим анестетиком амідного типу, що має як анестезувальний, так і зневолювальний ефект. При застосуванні високих доз досягається хірургічна анестезія, тоді як нижчі дози спричиняють сенсорну блокаду (аналгезію) з обмеженою та непропресуючою моторною блокадою.

Механізм дії полягає в оборотному зниженні мембранистії нервового волокна для іонів натрію. Внаслідок цього швидкість деполяризації зменшується, а поріг збудливості підвищується. Це в кінцевому результаті призводить до локальної блокади нервових імпульсів.

Час до початку дії та тривалість місцевої анестезії залежать від місця введення. Тривалість дії не можна обійтися шляхом додавання судинозулювальних засобів (наприклад, адреналину [леїненефрину]). Детально див. таблицю 1 у розділі «Способ застосування та дози».

**Фармакодинамічні ефекти.** Ропівакайн в умовах *in vitro* має менший негативний інотропічний ефект, ніж левобулівакайн та булівакайн.

Визначення впливу на серцеву діяльність, проведене *in vivo* у кількох дослідженнях на тваринах, показало, що ропівакайн має нижчу токсичність щодо серцевої діяльності, ніж булівакайн. Ця різниця була як якісною, так і кількісною.

Ропівакайн викликає менше розширення комплексу QRS, ніж булівакайн, а зміни виникають при більших дозах ропівакайну та левобулівакайну, ніж булівакайн.

Прямі серцево-судинні ефекти місцевих анестетиків включають уповільнену провідність, негативний інотропізм та зрештою аритмію і зупинку серця.

У дослідженнях на собаках, в яких препарати вводили внутрішньовоно до виникнення серцево-судинного колапсу, реваскуляризація була легкою і більш успішною після застосування ропівакайну, ніж після застосування левобулівакайну та булівакайну, ніж булівакайну.

Чутливість до системних токсичних ефектів ропівакайну вагітних овець була не вищою, ніж у невагітних.

Здовби добровольці дуже добре перенесли застосування ропівакайну внутрішньовоно у максимальних переносимих дозах, при цьому виникали очікувані симптоми з боку центральної нервої системи, а також був продемонстрований значно менший потенціал токсичності з боку центральної нервої та серцево-судинної системи, ніж після застосування булівакайну. Симптоми з боку центральної нервої системи (ЦНС) є подібними при застосуванні цих препаратів, проте при застосуванні булівакайну вони виникають при нижчих дозах і концентраціях у плазмі крові, а також мають більшу тривалість.

Непрямі серцево-судинні ефекти (артеріальна гіпотензія, брадикардія) можуть розвинутися після епідуральної блокади, залежно від ступеня супутньої симпатичної блокади, що, однак, менш виражено у дітей.

При потраплянні в кровообіг великої кількості препарата швидко розвиваються симптоми з боку центральної нервої та серцево-судинної системи (див. розділ «Передозування»).

Клінічний досвід використання цього лікарського засобу свідчить про широкий терапевтичний діапазон при застосуванні у рекомендованих дозах.

**Фармакокінетика.**

Ропівакайн має хіральний центр та доступний у вигляді чистого S-(—)-енантіомера. Ропівакайн є високорозчинною у ліпідах сполукою. Величина рРа ропівакайну становить 8,1, а коефіцієнт розподілу — 141 (25 °C n-октанол/фосфатний буфер при pH 7,4). Усі метаболіти мають місцевий анестезувальний ефект, але проявляють значно нижчу силу дії і мають коротшу тривалість дії, ніж ропівакайн.

**Абсорбція**

Ропівакайн демонструє повну та двофазну абсорбцію з епідурального простору; період напіввиведення для двох фаз становить приблизно 14 хвилин і 4 години відповідно. Повільна абсорбція є фактором, що обмежує швидкість виведення ропівакайну та пояснює, чому термінальний період напіввиведення після епідурального застосування є більшим, ніж після внутрішньового введення препарату.

**Розподіл**

Середнє значення загального плазмового кліренсу ропівакайну становить близько 440 мл/хв, нирковий кліренс — 1 мл/хв, об'єм розподілу ропівакайну у рівноважному стані становить 47 літрів, кінцевий період напіввиведення — 1,8 год після внутрішньового введення. Коефіцієнт проміжної печінкової екстракції становить приблизно 0,4.

Ропівакайн з'являється у плазмі крові переважно з α<sub>1</sub>-кислим глікопротеїном; нез'язана фракція становить приблизно 6 %.

Після внутрішньового введення об'єм розподілу ропівакайну у рівноважному стані становить 47 літрів. Після тривалої епідуральної інфузії спостерігається збільшення загальної концентрації ропівакайну та PPX (піпеколоксиліду) у плазмі крові, що залежало від післяоператорного збільшення рівня α<sub>1</sub>-кислого глікопротеїну. Збільшення концентрації нез'язаного, фармакологічно активного ропівакайну у плазмі крові було значно меншим, ніж збільшення концентрації загального ропівакайну у плазмі крові. Середня концентрація нез'язаного PPX була приблизно у 7–9 разів вищою, ніж середня концентрація нез'язаного ропівакайну після тривалої епідуральної інфузії тривалістю до 72 годин включно.

Ропівакайн проникає через плаценту, і щодо нез'язаного ропівакайну між вагітною і плодом досягається рівноважний стан. Ступінь з'явуання з білками плазми крові у плода менший, ніж у вагітної, що призводить до зниження загальної концентрації препарата у плазмі крові плода.

**Метаболізм**

Ропівакайн метаболізується у печінці переважно шляхом ароматичного гідроксилювання до 3-гідрокси-ропівакайну (каталізується за участю цитохрому CYP1A2) та шляхом Ндезалкітування до PPX (каталізується за участю цитохрому CYP3A4). PPX є активним метаболітом. Поріг токсичних для ЦНС плазмових концентрацій нез'язаного PPX у щуців є приблизно у 12 разів вищим, ніж такий поріг для нез'язаного ропівакайну. PPX є метаболітом, що має невелике значення після застосування одноразових доз препарату, проте після тривалої епідуральної інфузії він є основним метаболітом.

**Виведення**

Ропівакайн має середню та низьку швидкість виведення з печінки. Тому швидкість його виведення повинна залежати від плазмової концентрації нез'язаних фракцій. Після операційної підвищення альфа 1-кислого глікопротеїну приводить до зменшення нез'язаної фракції за рахунок збільшення з'явуання білка. Як було продемонстровано в дослідженнях у дітей та дорослих, це приводить до зниження загального кліренсу, що викликає підвищення загальної концентрації в плазмі крові. Кліренс нез'язаного ропівакайну залишається не змінним, проміжною та стабільною концентрацією нез'язаної фракції препарата під час післяоператорних інфузій. Тому фармакодинамічні ефекти та токсичність пов'язані з нез'язаною фракцією в плазмі крові.

Після внутрішньового введення всього 86 % дози виводиться з сечою, з яких лише приблизно 1 % — у незміненому стані. Основним метаболітом є 3-гідрокси-ропівакайн (каталізується за участю цитохрому CYP3A4). PPX є активним метаболітом. Поріг токсичних для ЦНС плазмових концентрацій нез'язаного PPX у щуців є приблизно у 12 разів вищим, ніж такий поріг для нез'язаного ропівакайну. PPX є метаболітом, що має невелике значення після застосування одноразових доз препарату, проте після тривалої епідуральної інфузії він є основним метаболітом.

**Виведення**

Ропівакайн метаболізується у печінці переважно шляхом ароматичного гідроксилювання до 3-гідрокси-ропівакайну (каталізується за участю цитохрому CYP1A2) та шляхом Ндезалкітування до PPX (каталізується за участю цитохрому CYP3A4). PPX є активним метаболітом. Поріг токсичних для ЦНС плазмових концентрацій нез'язаного PPX у щуців є приблизно у 12 разів вищим, ніж такий поріг для нез'язаного ропівакайну. PPX є метаболітом, що має невелике значення після застосування одноразових доз препарату, проте після тривалої епідуральної інфузії він є основним метаболітом.

Після роки життя кліренс нез'язаного ропівакайну та PPX залежить від маси тіла і віку дитини. Вплив віку інтерпретується з урахуванням дозрівання печінкової функції; кліренс, нормалізований відповідно до маси тіла, досягає максимуму приблизно в 1–3 роки. Кліренс нез'язаного ропівакайну збільшується з 2,4 л/год/кг у новонароджених і з 3,6 л/год/кг у немовлят віком 1 місяць до приблизно 8–16 л/год/кг у дітей віком від 6 місяців. Крім того, об'єм розподілу нез'язаного ропівакайну, нормалізований за масою тіла, збільшується з віком і досягає максимуму у віці 2 років. Об'єм розподілу нез'язаного ропівакайну збільшується з 22 л/кг у новонароджених і з 26 л/кг в однорічних немовлят до 42–66 л/кг у немовлят віком від 6 місяців.

Період напіввиведення ропівакайну довший: 5–6 годин у новонароджених і однорічних немовлят в порівнянні з 3 годинами у дітей старшого віку.

Період напіввиведення PPX є більшим: близько 43 годин у новонароджених і 26 годин у однорічних немовлят в порівнянні з 15 годинами у дітей старшого віку.

Залежно від недорозвиненості функції печінки системна експозиція вища у новонароджених і трохи вища у немовлят віком 1–6 місяців у порівнянні з дітьми старшого віку. Рекомендації щодо дозування препарату для проведення тривалої епідуральної інфузії частково компенсуватимуть цю різницю.

**Клінічні характеристики.**

Ропілонг 7,5 мг/мл та 10 мг/мл показаний дорослим і дітям віком від 12 років для анестезії при хірургічних втручаннях:

- епідуральна анестезія при хірургічних втручаннях, включаючи кесарів розтин;
- блокада великих нервів;
- блокада периферичних нервів.

**Протипоказання.**

- Підвищена чутливість до ропівакайну або будь-якої з допоміжних речовин;
- підвищена чутливість до інших місцевих анестетиків амідного типу;
- загальні протипоказання, пов'язані з епідуральною або регіонарною анестезією, незалежно від того, який місцевий анестетик застосовується;
- не застосовувати для внутрішньовоної регіонарної анестезії;
- не застосовувати для парацервікальної анестезії в акушерстві;

— не застосовувати для епідуральної анестезії у пацієнтів з гіповолемією.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодії.**

Ропілонг слід з обережністю застосовувати разом з лікарськими засобами, що за структурою схожі з місцевими анестетиками, тобто антиаритмічнimi засобами IB класу, такими як лідокайн і мексилетин, оскільки їхні токсичні ефекти є адитивними. Одночасне застосування лікарського засобу Ропілонг із загальними анестетиками або опіоїдами може посилювати несприятливі ефекти обох препаратів.

Специфічні дослідження взаємодії ропівакайну з антиаритмічними засобами III класу (наприклад аміодароном) не проводилися, проте у разі одночасного застосування рекомендується проявляти обережність (див. також розділ «Особливості застосування»).

Цитохром P450 (CYP) IA2 бере участь в утворенні 3-гідрокси-ропівакайну, основного метаболіту. В умовах *in vivo* плазмовий кліренс ропівакайну знижується до 77 % при його застосуванні одночасно з флувоксаміном, селективним та сильнодіючим інгібітором CYP

Для досягнення достатнього ступеня анестезії необхідно застосовувати мінімальні можливі дози лікарського засобу.

Дорослі та діти віком від 12 років

Нижче наводяться рекомендовані дози препарату: дозування слід коригувати відповідно до ступеня блокади та загального стану пацієнта.

**Аnestezia при хірургічних втручаннях** зазвичай потребує високих доз та більш високих концентрацій, ніж зневолювання з метою купірування гострого болю, для якого зазвичай рекомендуються концентрація 2 мг/мл. Проте для внутрішньосуглобових ін'єкцій рекомендуються концентрація 7,5 мг/мл.

Таблиця 1

Дорослі та діти віком від 12 років

Показання	Концентрація (мг/мл)	Об'єм (мл)	Доза (мг)	Початок дії (хв)	Тривалість дії (год)
<b>АНЕСТЕЗІЯ ПРИ ХІРУРГІЧНИХ ВТРУЧАННЯХ</b>					
Люмбальна епідуральна анестезія для проведення хірургічного втручання	7,5 мг/мл 10 мг/мл	15–25 мл 15–20 мл	113–188 мг 150–200 мг	10–20 хв 10–20 хв	3–5 год 4–6 год
Люмбальна епідуральна анестезія для проведення кесаревого розтину	7,5 мг/мл	15–20 мл	113–150 мг	10–20 хв	3–5 год
Торакальна епідуральна ін'єкція для післяопераційної зневолювальної блокади	7,5 мг/мл	5–15 мл залежно від місця ін'єкції	38–113 мг	10–20 хв	—
Блокада плечового сплетіння	7,5 мг/мл	10–40 мл	75–300 мг <sup>(1)</sup>	10–25 хв	6–10 год
Блокада невеликих нервів та ін'єкція анететика	7,5 мг/мл	1–30 мл	7,5–225 мг	1–15 хв	2–6 год
<b>КУПІРУВАННЯ ГОСТРОГО БОЛЮ</b>					
Люмбальне епідуральне введення					
Болюс	2 мг/мл	10–20 мл	20–40 мг	10–15 хв	0,5–1,5 год
Періодичні ін'єкції (додаткові дози), наприклад для зневолювання під час пологів	2 мг/мл	10–15 мл з інтервалими щонайменше 30 хвилин	20–30 мг	—	—
Тривала епідуральна інфузія, наприклад для зневолювання під час пологів	2 мг/мл	6–14 мл/год	12–20 мл/год	—	—
Торакальне епідуральне введення					
Тривала інфузія, наприклад для післяопераційного зневолювання	2 мг/мл	6–14 мл/год	12–28 мл/год	—	—
Блокада периферичних нервів та ін'єкція анететика	2 мг/мл	1–100 мл	2–200 мг	1–5 хв	2–6 год
Внутрішньосуглобова ін'єкція <sup>(2)</sup> (наприклад, одноразова доза при артроскопії колінного суглоба)	7,5 мг/мл	20 мл	150 мг <sup>(2)</sup>	—	2–6 год
Блокади периферичних нервів (стегнова або міждрабінчаста блокада)	2 мг/мл	5–10 мл/год	10–20 мл/год	—	—
Тривала інфузія або періодичні ін'єкції (наприклад, для післяопераційного зневолювання)					
Дози, наведені у таблиці 1, необхідні для забезпечення клінічно прийнятної блокади; їх слід розглядати як рекомендовані дози для дорослих.					
Існують значні індивідуальні коливання щодо часу початку та тривалості ефекту.					
<sup>(1)</sup> Дозу для блокади нервового сплетіння слід коригувати залежно від місця введення препарату та стану пацієнта. Міждрабінчасті і надключичні блокади плечового сплетіння можуть бути пов'язані з більшою частотою серйозних побічних реакцій незалежно від типу застосованого місцевого анететика (див. розділ «Особливості застосування»).					
<sup>(2)</sup> При введенні додаткової дози ропівакайну за допомогою будь-якої іншої методики одному і тому ж пацієнту не слід перевищувати сумарної дози 225 мг.					
<sup>(3)</sup> Після виходу препарата на ринок повідомлялося про розвиток хондролізу у пацієнтів, які отримували тривалу інфузію для проведення внутрішньосуглобової місцевої анетезії. Тривала внутрішньосуглобова інфузія не є затвердженим шляхом застосування препарату.					

Важливо дотримуватися особливої обережності для попередження випадкових внутрішньосудинних ін'єкцій. До та під час ін'єкції загальної дози рекомендуються ретельно проводити аспираційну пробу. Загальну дозу слід вводити повільно, зі швидкістю 25–50 мл/хв або окремими дозами, постійно спостерігаючи за станом пацієнта. При епідуральному введенні рекомендуються ввести тестову дозу 3–5 мл ксилокаїну адреналіну.

Випадкове внутрішньосудинне введення може спричинити, наприклад, короткотривале збільшення частоти серцевих скорочень, а випадкове інтратекальне введення може привести до появи ознак спінальної блокади. При виникненні симптомів інтоксикації ведення препарату слід негайно припинити.

При проведенні епідуральної блокади при хірургічних втручаннях застосовують одноразові дози до 250 мг ропівакайну, які добре переносяться.

При блокаді плечового нервового сплетіння шляхом введення 40 мл препарату Ропілонг з концентрацією 7,5 мг/мл максимальні концентрації ропівакайну у плазмі крові деяких пацієнтів можуть наближатися до рівня, при якому описувалися легкі симптоми токсичного впливу препарату на ЦНС. Тому не рекомендуються застосовувати дози, що перевищують 40 мл препарату Ропілонг з концентрацією 7,5 мг/мл (300 мг ропівакайну).

При проведенні тривалої інфузії або повторних болях ін'єкцій слід враховувати ризик виникнення токсичних концентрацій у плазмі крові або ураження місцевого нерва. Сумарні дози до 675 мг ропівакайну, що вводили протягом 24 годин, добре переносилися дорослими пацієнтами під час анетезії при хірургічних втручаннях та при купіруванні післяопераційного болю. Добра переносимість також спостерігалася у дорослих при тривалих епідуральних інфузіях, які проводили після хірургічного втручання протягом 72 годин зі швидкістю інфузії до 28 мл/год. В обмеженої кількості пацієнтів введення більш високих доз препарату (до 800 мг/добу) супроводжувалося появою відносно невеликої кількості небажаних реакцій.

Купірування післяопераційного болю. Блокаду проводять перед хірургічним втручанням шляхом введення лікарського засобу Ропілонг 10 мг/мл чи 7,5 мг/мл або після хірургічного втручання шляхом епідурального блоківного введення лікарського засобу Ропілонг 7,5 мг/мл. Аналгезію підтримують епідуральною інфузією лікарського засобу Ропілонг 2 мг/мл. Клінічні дослідження продемонстрували, що інфузія зі швидкістю 6–14 мл (12–28 мл) на годину зазвичай забезпечує задовільну анетезію при помірному та сильно післяопераційному болю, причому у більшості випадків спостерігається лише слабкий і непрогресуючий моторний блок. Максимальна тривалість епідуральної блокади становить 3 дні. Однак слід проводити ретельний моніторинг щодо зневолювальної дії препарату для того, щоб видати катетер, як тільки бальзовий стан дозволить це. Ця методика дає змогу значною мірою зменшити потребу у додатковому застосуванні опіоїдних аналгетиків.

Також проводилися клінічні дослідження, в яких ропівакайн у дозі 2 мг/мл застосовували окремо або у поєднанні з фентанілом (1–4 мкг/мл) протягом 72 годин у вигляді епідуральної інфузії для післяопераційного зневолювання. Ропівакайн 2 мг/мл (6–14 мл/год) забезпечував адекватне зневолювання у більшості пацієнтів. Комбінація ропівакайну з фентанілом забезпечувала краще зневолювання, однак спричиняла небажані опіоїдні ефекти.

При кесаревому розтині епідуральне застосування ропівакайну у концентрації понад 7,5 мг/мл або спінальне застосування не задокументовано.

При проведенні довготривалої блокади периферичних нервів шляхом тривалої інфузії або повторних ін'єкцій слід враховувати ризик досягнення токсичної концентрації препарату у плазмі крові або спричинення місцевого неврологічного ураження. У клінічних дослідженнях блокада стегнового нерва перед хірургічним втручанням досягалася шляхом введення 300 мг ропівакайну з концентрацією 7,5 мг/мл, а міждрабінчаста блокада — шляхом введення 225 мг ропівакайну з концентрацією 7,5 мг/мл. Далі аналгезію підтримували введенням ропівакайну у дозі 2 мг/мл. Швидкість інфузії або періодичні ін'єкції по 10–20 мл на годину протягом 48 годин забезпечували достатньою аналгезією та добре переносилися.

Ропівакайн у дозах 7,5 та 10 мг/мл може чинити системний токсичний вплив та токсичний вплив на центральну нервову систему у дітей. Таким чином, для застосування таким пацієнтам більш прийнятним є найнижчий рівень концентрації препарату (2 мг/мл).

Вказівки щодо доз препарату для проведення периферичної блокади у немовлят і дітей явлюють собою методологічну основу щодо застосування препарату дітям без серйозних захворювань. Щодо дітей із серйозними захворюваннями рекомендовано застосування нижчих доз препарату та проведення ретельного моніторингу.

Застосування ропівакайну недоношеним дітям не було задокументовано.

Важливо дотримуватися більшої обережності для попередження випадкових внутрішньосудинних ін'єкцій. До та під час ін'єкції загальної дози рекомендуються ретельно проводити аспираційну пробу. Під час введення препарату слід уважно спостерігати за життєво важливими функціями пацієнта. При виникненні ознак токсичного впливу ведення препарату слід негайно припинити.

При застосуванні розрахункових доз рекомендуються фракціонування загальної дози незалежно від шляху введення препарату.

Каудальна епідуральна ін'єкція ропівакайну у дозі 2 мг/мл забезпечує адекватне післяопераційне зневолювання нижче рівня T12 у більшості дітей, коли доза 2 мг/мл застосовується в обсямі 1 мл/кг. Об'єм каудальної епідуральної ін'єкції може бути скоригованій, щоб досягти контролю за поширенням сенсорної блокади. Дози препарату до 3 мг/кг включно при концентрації ропівакайну 3 мг/мл безпечно застосовували дітям віком від 4 років.

Досвід застосування каудальних блокад дітям з масою тіла понад 25 кг обмежений.

**Діти.** Лікарський засіб застосовується у педіатричній практиці.

Вказівки щодо застосування й утилізації

Ропілонг, розчин для ін'єкцій, не містить консервантів та призначений лише для одноразового застосування. Залишки розчину слід утилізувати. Невідкірту упаковку не слід піддавати повторному автоклавуванню.

Перед застосуванням лікарський засіб слід візуально перевірити. Можна використовувати тільки прозорий розчин у непошкоджений упаковці.

**Передозування.**

**Токсичність** Після випадкових внутрішньосудинних ін'єкцій при проведенні блокад плечового нервового сплетіння та інших периферичних блокад спостерігаються випадки судом.

Після спінального застосування не очікується розвиток системної токсичності, оскільки в цьому випадку застосовується низька доза препарату. Інтратекальне застосування дуже високої дози препарату може привести до тотальній спінальної блокади, що у свою чергу приведе до тяжкого припинення діяльності серцево-судинної системи та розвитку дихальної недостатності.

**Симптоми** Системні токсичні реакції головним чином стосуються центральної нервової та серцево-судинної системи. Випадкові внутрішньосудинні ін'єкції місцевих анететиків можуть спричинити негайні (від кількох секунд до кількох хвилин) системні токсичні реакції. У разі передозування системна токсичність проявляється пізніше (через 15–60 хвилин після ін'єкції) внаслідок повільнішого збільшення концентрації місцевого анететика в крові.

**Лікування** При виникненні ознак гострої системної токсичності застосування місцевих анететиків слід негайно припинити. Симптоми, щ